

不孕与不育



[不孕与不育 下载链接1](#)

著者:罗丽兰 编

出版者:

出版时间:1998-12

装帧:

isbn:9787117112437

《不孕与不育(第2版)》全书分六篇, 43章。内容简介: 潜伏期平均3~4周, 典型损害为硬下疳 (hard chancre)。开始在螺旋体侵入部位出现一红色小丘疹或硬结, 以后表现为糜烂, 形成浅在性溃疡, 性质坚硬, 不痛, 呈圆形或椭圆形, 境界清楚, 边缘整齐, 呈堤状隆起, 周围有暗红色浸润, 有特征软骨样硬度, 基底平坦, 无脓液, 表面附有类纤维蛋白薄膜, 不易除去, 如稍挤压, 可有少量浆液性渗出物, 含有大量梅毒螺旋体, 为重要传染源。硬下疳大多单发, 亦可见有2-3个者。以上为典型的硬下疳。但如发生在原有的糜烂、裂伤或已糜烂的疮疹或龟头炎处, 则硬下疳亦呈现与此种原有损害相同形状, 遇有此种情况应进行梅毒螺旋体检查。

作者介绍:

目录:

[不孕与不育 下载链接1](#)

标签

不育

评论

[不孕与不育_下载链接1](#)

书评

[不孕与不育_下载链接1](#)